



EFFECTO ESTABILIZADOR DE DISTINTOS COADYUVANTES SOBRE MEZCLAS INESTABLES DE AGROQUÍMICOS

Ensayo de Laboratorio.

ESTUDIO DE AGRONOMÍA GIRAUDO - EULA

ING. AGR. RAMOS NICOLÁS, ING. AGR. GIRAUDO CRISTIAN, ING. AGR. EULA NESTOR, ING. AGR. PICCA KEVIN

Objetivo del Ensayo:

Evaluar el comportamiento de diferentes coadyuvantes como estabilizantes en mezclas de Fomesafem 25 gr (SL) + Glifosato Sal Monoamónica 79,2 gr (SG).

Condiciones del Ensayo:

Para evaluar la estabilidad de la mezcla, se aplicó un protocolo en cuatro fases sucesivas, diseñado para someterlas a condiciones cada vez más exigentes hasta detectar algún signo de inestabilidad.

- **Fase 1:** Cada mezcla se diluyó inicialmente en 40 litros de agua, con una dureza de 160 ppm de CaCO_3 . Si bajo esa condición la mezcla alcanzaba un grado de estabilidad 3, 4 o 5 (es decir, aceptable o estable), se avanzaba a la fase siguiente.
- **Fase 2:** Se preparaba nuevamente la misma mezcla, pero en una concentración mayor, equivalente a una dilución en 20 litros de agua.
- **Fase 3:** Si la mezcla continuaba mostrando estabilidad (grado 3, 4 o 5), se volvía a preparar, ahora en 40 litros de agua con alta dureza (920 ppm de CaCO_3).
- **Fase 4:** Finalmente, si todavía se mantenía estable, se ensayaba en 20 litros con agua dura

Este diseño buscó **forzar condiciones críticas** que permitieran revelar inestabilidad en la mezcla. La fase en la que por primera vez se observaba separación de fases o pérdida de homogeneidad se definió como **Fase Crítica**.

Una vez identificada esta fase, se volvió a preparar la mezcla bajo esa condición, incorporando en primer lugar los distintos coadyuvantes evaluados, con el objetivo de analizar su efecto estabilizador.

Evaluación de Estabilidad

Se utilizó una escala visual adaptada del Centro Brasileño de Bioaeronáutica




Grado	Condición	Resultado
1	Separación inmediata	No aplicar
2	Separación después de 1'	No aplicar
3	Separación después de 5'	Agitación continua
4	Separación después de 10'	Agitación continua
5	Estabilidad perfecta 30'	Sin restricción

Coadyuvantes Evaluados

- A: EMAG modificado (Impact) – 50 cc/ha
- B: EMAG + emulsionantes + tensoactivos – 250 cc/ha
- C: EMAG + propionato de amonio (Carrier) – 30 cc/ha
- D: EMAG + siliconas – 250 cc/ha
- E: EMAG + alcohol graso etoxilado – 500 cc/ha
- F: Buffer – 400-600 cc/ha (sólo en mezclas con incompatibilidad química)

Resultados Generales

Coadyuva ntes	IMPACT 50cc/ha	EMAG + emuls. + tensoact. 250/ha	CARRIER 30 cc/ha	EMAG + SILICONAS 250 cc/ha	EMAG + Alcohol graso etoxilado 500 cc/ha	BUFFER 400/600 cc/ha
Grado de Estabilidad	5	5	1	4	4	5



Conclusiones

En mezclas de **Fomesafem y Glifosato**, las diferencias entre coadyuvantes fueron claras. **IMPACT**, con solo 50 cc/ha, logró la **máxima estabilidad** (grado 5), igualando el resultado del EMAG modificado



que necesitó 250 cc/ha, lo que demuestra que con **menos producto se puede obtener igual efecto**. **CARRIER**, no alcanzó a estabilizar la mezcla (grado 1), sin embargo la dosis utilizada fue muy baja (30 cc/ha).

Las combinaciones de **EMAG con siliconas** y con alcohol graso etoxilado lograron un nivel aceptable de estabilidad (grado 4). El **buffer**, usado para problemas de incompatibilidad química, también dio el máximo grado de estabilidad (5).

En resumen, **IMPACT se destacó por ofrecer la mejor combinación entre resultado y baja dosis aplicada**.